

Feuille d'exercices numéro 3

EDO LINÉAIRES PÉRIODIQUES
MÉTHODES DES PERTURBATIONS ET TEMPS DE VIE

Exercice 1 Soit $A \in C^0(\mathbb{R}, M(n, \mathbb{R}))$ une application T -périodique. Démontrer que $X(\cdot)$ est une solution T -périodique de $\dot{X}(t) = A(t)X(t)$ si et seulement si $X(0)$ est vecteur propre de $R_A(T, 0)$ de valeur propre associée 1.

Exercice 2 Soit $a(\cdot) \in C^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ et T -périodique. On note $R(t, s)$ la résolvante de l'équation différentielle linéaire d'ordre 1 naturellement associée à

$$\ddot{x}(t) + a(t)x(t) = 0 \quad (1)$$

et on suppose que $R(T, 0)$ est elliptique. On ajoute un terme de frottement à l'équation précédente ; que dire de la stabilité de

$$\ddot{x}(t) + \gamma \dot{x}(t) + a(t)x(t) = 0, \quad (2)$$

pour $0 < \gamma \ll 1$? [On pourra démontrer dans un premier temps que la résolvante $R_\gamma(T, 0)$ du système (2) entre 0 et T est de déterminant < 1 .]

Exercice 3 Soit $a : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continue et 1-périodique. On note $R(t, s)$ la résolvante de l'équation différentielle linéaire d'ordre 1 naturellement associée à

$$\ddot{x}(t) + a(t)x(t) = 0. \quad (3)$$

1) Démontrer que $R(t, s)$ est à valeurs dans $SL(2, \mathbb{R})$.

2) On suppose que $a(t) = \omega^2 + \epsilon \cos(2\pi t)$ où $\omega > 0$. Démontrer que si $|\epsilon|$ est suffisamment petit toutes les solutions de (3) sont bornées sur $\mathbb{R}$.

Exercice 4 Soient $a : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une application continue T -périodique non-nulle et ϵ un petit paramètre réel. On considère $x : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une solution de l'équation différentielle

$$x''(t) + a\left(\frac{t}{\epsilon}\right)x(t) = 0. \quad (4)$$

1) On pose $X(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ x'(t) \end{pmatrix}$ et $Y(t) = X(\epsilon t)$. Vérifier que Y est solution d'une EDO de la forme

$$Y'(t) = \epsilon A(t)Y(t). \quad (5)$$

où A est une fonction T -périodique que l'on déterminera.

2) On note $R_\epsilon(t, 0)$ la résolvante de l'EDO linéaire (5).

2.a) Démontrer que pour ϵ suffisamment petit il existe des fonctions continues $Y_1, Y_2 : [0, T] \rightarrow M_2(\mathbb{R})$ et une fonction $G : [0, \epsilon_0] \rightarrow C^1([0, T], M_2(\mathbb{R}))$ vérifiant $\|G(\epsilon, \cdot)\|_{C^1([0, T], M_2(\mathbb{R}))} = o(\epsilon^2)$ telles que pour tout $t \in [0, T]$

$$R_\epsilon(t, 0) = I + \epsilon Y_1(t) + \epsilon^2 Y_2(t) + G(\epsilon, t).$$

2.b) Calculer $Y_1(0)$ et $Y_2(0)$ puis $Y_1(\cdot)$ et $Y_2(\cdot)$.

2.c) Donner un développement limité de $\text{tr} R(T, 0)$ à l'ordre 2.

3) On suppose que $\int_0^T a(t)dt > 0$. Démontrer que toutes les solutions de l'EDO (4) sont bornées pourvu que ϵ soit suffisamment petit.

4) Démontrer que si la condition de la question précédente est vérifiée, il existe une infinité de valeur de ϵ sur un voisinage de 0 pour lesquelles toutes les solutions de (4) sont périodiques (mais pas forcément de période T).

Exercice 5 Soit l'équation différentielle $\ddot{x} + \gamma \dot{x} + (1 + \varepsilon \cos(2t))x = 0$ où ε, γ sont des paramètres. Discuter la stabilité de son équilibre $x = 0$ dans les cas suivants :

- 1) $\gamma = 0$ et $0 < \varepsilon \ll 1$
- 2) $0 < \gamma \ll \varepsilon \ll 1$.

Exercice 6 On considère la fonction $f : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par

$$f(t, y) = (-y_1^3 + y_2^2 + 2ty_1, -y_2^5 + 3ty_1^2).$$

Démontrer que pour tout $v \in \mathbb{R}^2$, le problème de Cauchy

$$y'(t) = f(t, y(t)), \quad y(0) = v$$

admet une unique solution définie sur $[0, \infty[$.

Exercice 7 Démontrer que le problème de Cauchy

$$y'(t) = y(t) + e^{-3t}y(t)^2 \quad y(0) = 1/3$$

admet une unique solution $y : [0, \infty[\rightarrow \mathbb{R}$.

Exercice 8 On considère l'équation différentielle scalaire réelle d'ordre 2 ($x(\cdot)$ est à valeurs réelles),

$$x''(t) + x(t) = \mu \cdot \left((1 + \cos t) \sin(x(t)) + \cos(2t) \right), \quad (6)$$

où μ est un paramètre réel et on se propose de démontrer que pour les petites valeurs de μ cette équation admet des solutions 2π -périodiques.

Pour cela on écrit l'équation (6) sous la forme

$$X'(t) = AX(t) + \mu F(X(t), t), \quad (7)$$

où $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ et $F : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ est définie par $F\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, t\right) = \begin{pmatrix} 0 \\ (1 + \cos t) \sin x_1 + \cos(2t) \end{pmatrix}$

1) Pour $\mu = 0$, calculer la solution $X_{0,v}(\cdot)$ de (7) qui prend la valeur $v = (v_1, v_2) \in \mathbb{R}^2$ en $t = 0$.

2) Soient $\mu \in \mathbb{R}$ et $v = (v_1, v_2) \in \mathbb{R}^2$. Montrer que pour tout $v \in \mathbb{R}^2$ l'unique solution de (7) telle que $X(0) = v$ est définie sur $\mathbb{R}$ tout entier. On la note $X_{\mu,v}(\cdot)$.

3) Montrer que pour $\mu \neq 0$, $X_{\mu,v}(\cdot)$ est 2π -périodique si et seulement si

$$\int_0^{2\pi} \begin{pmatrix} \cos s & -\sin s \\ \sin s & \cos s \end{pmatrix} F(X_{\mu,v}(s), s) ds = 0. \quad (8)$$

4) On note H la fonction $H : (\mu, v) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par

$$H(\mu, v) = \int_0^{2\pi} \begin{pmatrix} \cos s & -\sin s \\ \sin s & \cos s \end{pmatrix} F(X_{\mu,v}(s), s) ds.$$

4.a) Montrer que H est de classe C^∞ .

4.b) Montrer que

$$H\left(0, \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} -\int_0^{2\pi} \left((1 + \cos s) \sin(v_1 \cos s + v_2 \sin s) + \cos(2s)\right) \sin s ds \\ \int_0^{2\pi} \left((1 + \cos s) \sin(v_1 \cos s + v_2 \sin s) + \cos(2s)\right) \cos s ds \end{pmatrix}.$$

4.c) Montrer que $H(\mu = 0, v = 0) = 0$.

4.d) Notons $D_v H(0, 0)$ la dérivée de H par rapport à la variable $v \in \mathbb{R}^2$ au point $(\mu, v) = (0, 0)$ (c'est-à-dire la dérivée de $v \mapsto H(0, v)$ en $v = 0$). Calculer $D_v H(0, 0)$.

5) En déduire qu'il existe un $\epsilon_0 > 0$ et une fonction de classe C^∞

$$\begin{aligned} v : (-\epsilon_0, \epsilon_0) &\rightarrow \mathbb{R}^2 \\ \mu &\mapsto v(\mu) \end{aligned}$$

telle que $H(\mu, v(\mu)) = 0$. Qu'en conclure ?

Exercice 9 On considère le système différentiel

$$\begin{cases} \dot{x} = -x + y^2 \\ \dot{y} = -y + x^2 \end{cases}$$

Démontrer que pour (x_0, y_0) assez petit, les solutions de l'équation différentielle précédente, de condition initiale $(x(0), y(0)) = (x_0, y_0)$, sont définies pour tout temps $t > 0$. Que dire de la stabilité de l'origine ?

Exercice 10 1) Soit φ une fonction positive continue sur un intervalle $[0, T]$. On suppose qu'il existe des fonctions réelles f et g positives, continues sur $[0, T]$ telles que pour tout $t \in [0, T]$

$$\varphi(t) \leq f(t) + \int_0^t g(s)\varphi(s)ds.$$

Montrer que pour tout $t \in [0, T]$ on a

$$\varphi(t) \leq f(t) + \int_0^t e^{\int_s^t g(s)ds} g(s)f(s)ds.$$

2) Soient $A : \mathbb{R}_+ \rightarrow M(n, \mathbb{R})$ et $p : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}^n$ deux applications continues. On considère la solution sur $[0, \infty]$ de l'équation différentielle

$$\dot{x}(t) = A(t)x(t) + p(t).$$

Montrer que si $\int_0^\infty \|A(t)\|dt < \infty$ et $\int_0^\infty \|p(t)\|dt < \infty$, alors $\sup_{t \in [0, \infty[} \|x(t)\| < \infty$.

Exercice 11 Soit $f : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}^n$ une fonction continue des deux variables et localement lipschitzienne par rapport à la première variable. On suppose qu'il existe deux fonctions continues $\alpha, \beta : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$ telles que pour tout $x \in \mathbb{R}^n$ et tout $t \in \mathbb{R}_+$ on ait $\langle f(x, t), x \rangle \leq \alpha(t) + \beta(t)\|x\|^2$. Montrer que chaque solution de l'équation $\dot{x} = f(x, t)$ est définie sur $[0, \infty[$.

Exercice 12 1) Quel est le temps de vie des solutions de l'équation suivante

$$\dot{x} = (x^2 + 1) \cos(\pi x)?$$

2) Le temps de vie des solutions des équations suivantes est-il fini

$$\begin{aligned} \dot{x} &= 1 + t^2 + x^2 \\ \dot{x} &= 1 - t^2 + x^2? \end{aligned}$$

Dans le second cas on pourra commencer par étudier une solution de condition initiale $x(0) > 0$ et étudier la fonction $x(t) - t$.

Exercice 13 Soient Ω un ouvert de $\mathbb{R}^n$ et $f : \Omega \times [a, b[\rightarrow \mathbb{R}^n$ une fonction continue, localement lipschitzienne en la première variable. On suppose que f est *quasi-croissante*, c'est-à-dire que pour tout $j \in \{1, \dots, n\}$ on a

$$\text{si } x_j = y_j \text{ et } x_i \leq y_i \text{ pour } i \neq j, \text{ alors } f_j(x_1, \dots, x_n, t) \leq f_j(y_1, \dots, y_n, t).$$

On considère x une solution de $\dot{x} = f(x, t)$ sur $[c, d[$ et $y : [c, d[\rightarrow \Omega$ telle que pour tout $t \in [c, d[$, tout $j = 1, \dots, n$ on ait $y_j(c) \leq x_j(c)$ et $\dot{y}_j(t) \leq f_j(y, t)$.

1) Soit $\epsilon > 0$ et x^ϵ la solution de $\dot{x}^\epsilon = f(x^\epsilon, t) + (\epsilon, \epsilon, \dots, \epsilon)$, $x^\epsilon(c) = x(c)$, montrer que $x^\epsilon \rightarrow x$ quand $\epsilon \rightarrow 0$ (en donnant un sens précis à cette assertion).

2) Montrer que $y_j(t) < x_j^\epsilon(t)$ pour tout $t \in]c, d[$ où x^ϵ existe.

3) En déduire que pour tout $t \in [c, d[$ et tout $j = 1, \dots, n$ on a $y_j(t) \leq x_j(t)$.

Exercice 14 On considère l'équation de Blasius

$$u''' = uu'', \quad u(0) = u'(0) = 0, \quad u''(0) = 1. \quad (9)$$

1) Mettre l'équation sous la forme d'un système nonlinéaire du premier ordre. En déduire que (9) admet une solution maximale que l'on notera $u(t)$.

2) Soit $c \in \mathbb{R}$. Vérifier que la fonction $v_c(t) = \frac{3}{c-t}$ satisfait $v_c''' = v_c v_c''$ sur son domaine de définition. En déduire, en utilisant l'exercice précédent, une majoration de u et une minoration de son temps d'explosion.

3) Toujours à l'aide de l'exercice précédent, montrer qu'on a $u(t) \geq t^2/2$, $u'(t) \geq t$ et $u''(t) \geq 1$ pour tout t dans le domaine de définition de u . En utilisant cette minoration à un instant t_0 , déduire une minoration de u par une fonction de la forme v_c après t_0 et donc une majoration des temps d'explosion.